

# TERAPIAS CONTRA A COVID-19

## GUIA RÁPIDO

| Tipos de terapias contra a COVID-19 | Profilaxia pré-exposição  | Anticorpos monoclonais  | Antivirais orais  | Antivirais via infusão intravenosa  |
|-------------------------------------|---|---|---|---|
| O que está disponível               | Evusheld  | Bebtelovimab  | Lagevrio (molnupiravir)<br>Paxlovid   | VEKLURY (remdesivir)  |
| Para quem é?                        | <p>Pacientes adultos e crianças (a partir de 12 anos de idade pesando, pelo menos, 40 kg) que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>no momento não estejam infectados com SARS-CoV-2 (COVID-19).</li> <li>não tenham sido expostos recentemente a uma pessoa infectada com SARS CoV-2 (COVID-19).</li> <li>sejam imunossuprimidos de forma moderada a severa.</li> <li>não podem receber a vacina contra a COVID-19.</li> </ul> | <p>Pacientes adultos e crianças (a partir de 12 anos de idade pesando, pelo menos, 40 kg) que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tenham alto risco de desenvolver a forma grave da COVID-19, incluindo hospitalização ou morte.</li> </ul> | <p>Paxlovid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pacientes adultos e crianças (a partir de 12 anos e pesando, pelo menos, 40 kg)</li> </ul> <p>Lagevrio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adultos com alto risco de desenvolver a forma grave da COVID-19, incluindo hospitalização ou morte.</li> <li>Adultos que não podem receber opções alternativas de tratamento para COVID-19 ou não têm acesso a outros tratamentos para COVID-19</li> </ul> | <p>Pacientes adultos e crianças (a partir de 12 anos de idade pesando, pelo menos, 40 kg) que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>estejam hospitalizados</li> <li>não estejam hospitalizados, mas têm alto risco de desenvolver a forma grave da COVID-19, incluindo hospitalização ou morte.</li> </ul> <p>Pacientes infantis pesando entre 3,5 kg e menos de 40 kg ou pacientes infantis menores de 12 anos de idade pesando, pelo menos, 3,5 kg que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>estejam hospitalizados</li> <li>não estejam hospitalizados, mas têm alto risco de desenvolver a forma grave da COVID-19, incluindo hospitalização ou morte.</li> </ul> |
| Quando posso receber?               | Duas semanas após a vacina  | Dentro de sete dias ou menos após testar positivo para COVID-19   | Dentro de cinco dias ou menos após testar positivo para COVID-19  | Dentro de sete dias ou menos após testar positivo para COVID-19   |
| Como faço para receber?             | Provedores de assistência médica  | Provedores de assistência médica  | Provedores de assistência médica ou Farmácias locais  | Unidades de saúde que fazem internação  |

Mais informações estão disponíveis em [hhs.gov](https://hhs.gov)



DOH 825-035 May 2022 Brazilian Portuguese

Para solicitar este documento em outro formato, ligue para 1-800-525-0127. Os clientes com deficiência auditiva deverão ligar para 711 (Washington Relay) ou enviar um e-mail para [civil.rights@doh.wa.gov](mailto:civil.rights@doh.wa.gov).