

چارت واکسین های ضروری بخاطر مراقبت از طفل برای والدین



راهنمای ها: برای اینکه ببینید کدام واکسین برای مراقبت طفل ضروری است، سن طفل خود را پیدا کنید و برای یافتن واکسین ها و دوزهای مورد نیاز به آن ردیف ببینید. اطفال باید حداقل فواصل و سن واکسین را داشته باشند تا شرایط لازم را برآورده کنند. لطفاً اگر سوالی دارید با ارائه دهنده مراقبت های صحتی یا ارائه دهنده مراقبت از طفل خود صحبت نمایید.

واریسلا (آبله مرغان)	سرخکان، گوشک، روبیلا	کنزوگه نیوموکوکل	پولیو	هیپ انفلونزای هیموفیلوس نوع ب	اسهال، تیتانوس، سیاه سرفه	هپیتایتس B	
Varicella	MMR	PCV	Polio	HIB	DTaP	Hepatitis B	
به طور معمول قبل از 12 ماهگی داده نمی شود	به طور معمول قبل از 12 ماهگی داده نمی شود	1 دوز	1 دوز	1 دوز	1 دوز	2 دوز	در 3 ماهگی
		2 دوز	2 دوز	2 دوز	2 دوز	2 دوز	در 5 ماهگی
		3 دوز	2 دوز	2-3 دوز**	3 دوز	2 دوز	در 7 ماهگی
1 دوز	1 دوز	4 دوز**	2 دوز	3-4 دوز**	3 دوز	2 دوز	16 ماهگی
1 دوز	1 دوز	4 دوز**	3 دوز	3-4 دوز**	4 دوز	3 دوز	در 19 ماهگی
2 دوز	2 دوز	به طور معمول به اطفال 5 ساله و بالاتر داده نمی شود	4 دوز**	به طور معمول به اطفال 5 ساله و بالاتر داده نمی شود	5 دوز**	3 دوز	در 7 سالگی یا دوره قبل از مکتب/ورود به مکتب در < 4 سالگی*

*اطفالی که در صنف قبل از دوره مکتب- صنف 12ام می روند باید شرایط واکسیناسیون را برای صنف خود در مکتب داشته باشند.
**ممکن است دوزهای واکسین با کمتر از مقدار ذکر شده قابل قبول باشد، نظر به زمان تزریق آنها.

چارت شرایط قبل از دوره مکتب- صنف 12ام و منابع اضافی واکسیناسیون را می توان در این آدرس یافت میشود: doh.wa.gov/vaxtoschool
معلومات مربوط به سایر واکسین های مهم که برای حضور مراقبت طفل نیاز نیستند را در این آدرس بیابید: www.immunize.org/cdc/schedules

برای درخواست این سند به فارمت دیگری، لطفاً به این شماره 1-800-525-0127 زنگ بزنید. مشتریان کر یا افرادی که در بخش شنوایی مشکل دارند، لطفاً به شماره 711