

# GUÍA RÁPIDA DE TERAPIAS PARA EL COVID-19

Tipo de terapia para el COVID-19	Profilaxis preexposición	Anticuerpos monoclonales	Antivirales orales	Antivirales intravenosos
¿Qué está disponible?	Evusheld	Bebtelovimab	Lagevrio (molnupiravir) Paxlovid	VEKLURY (remdesivir)
¿Para quiénes se recomienda?	<p>Pacientes adultos y pediátricos (de al menos 12 años y mayores que pesen al menos 40 kg) que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No tengan una infección actual por SARS-CoV-2 (COVID-19).</li> <li>No hayan tenido una exposición conocida reciente a una persona infectada con SARS CoV-2 (COVID-19).</li> <li>Tengan inmunodepresión de moderada a grave.</li> <li>No tengan una recomendación para recibir la vacuna contra el COVID-19.</li> </ul>	<p>Pacientes adultos y pediátricos (de al menos 12 años y mayores que pesen al menos 40 kg) que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tengan riesgo alto de avanzar a un caso grave de COVID-19, incluida la hospitalización o la muerte.</li> </ul>	<p><b>Paxlovid:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pacientes adultos y pediátricos (de 12 años y mayores que pesen al menos 40 kg).</li> </ul> <p><b>Lagevrio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adultos con riesgo alto de avanzar a un caso grave de COVID-19, incluida la hospitalización o la muerte.</li> <li>Adultos para quienes no se recomiendan opciones de tratamiento alternativo para el COVID-19 o no tienen acceso a otras opciones de tratamiento para el COVID-19.</li> </ul>	<p>Pacientes adultos y pediátricos (de 12 años y mayores que pesen al menos 40 kg) que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estén hospitalizados.</li> <li>No estén hospitalizados y tengan riesgo alto de avanzar a un caso grave de COVID-19, incluida la hospitalización o la muerte.</li> </ul> <p>Pacientes pediátricos que pesen de 3,5 kg a 40 kg o pacientes pediátricos menores de 12 años que pesen al menos 3,5 kg y:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estén hospitalizados.</li> <li>No estén hospitalizados y tengan riesgo alto de avanzar a un caso grave de COVID-19, incluida la hospitalización o la muerte.</li> </ul>
¿Cuándo acceder a ella?	2 semanas después de la vacuna	En un plazo de 7 días o menos tras dar positivo de COVID-19	En un plazo de 5 días o menos tras dar positivo de COVID-19	En un plazo de 7 días o menos tras dar positivo de COVID-19
¿Cómo se consigue?	Proveedores de atención médica	Proveedores de atención médica	Proveedores de atención médica, farmacias locales	Centros de cuidado de salud con internación

Hay más información disponible en [hhs.gov](https://hhs.gov)



DOH 825-035 May 2022 Spanish

Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127. Las personas con sordera o problemas de audición pueden llamar al 711 (Washington Relay) o enviar un correo electrónico a [civil.rights@doh.wa.gov](mailto:civil.rights@doh.wa.gov).