

သင်၏ နို့စို့ကလေးအတွက် ကလေးဖြည့်စွက်စာအသစ် ပြောင်းလဲခြင်း

ကျန်းမာသော နို့စို့ ကလေးအများစုသည် ကလေးဖြည့်စွက်စာအားလုံးကို စားသုံးပါမည်

မှတ်စားရန်-


- ပုံမှန်ကလေးဖြည့်စွက်စာ အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲစားသုံးနေရသည့် နို့စို့ ကလေးများသည် အပြောင်းအလဲကို ပိုမိုလျင်မြန်စွာ လက်ခံနိုင်ခြင်း ရှိနိုင်ပါသည်။
- ကလေးဖြည့်စွက်စာနှစ်မျိုးကို 50/50 1-3 ရက်စာ ရောနှောပါ။
- သင့်ကလေးသည် အပြောင်းအလဲကို ဖြေဖြေလုပ်ပေးရန် လိုအပ်ပါက ဖြည့်စွက်စာ ပြောင်းသုံးခြင်းအတွက် အဆင့်များကို လိုက်နာပါ။
- အောက်ပါအဆင့်များသည် နို့စို့ ကလေးများအား ကုစားပေးသော ကလေးဖြည့်စွက်စာတစ်မျိုးမှ နောက်တစ်မျိုးသို့ ပြောင်းလဲနိုင်စေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
- သင့်တွင် မေးခွန်းများ သို့မဟုတ် စိုးရိမ်မှု များ ရှိပါက သင်၏ Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC, အမျိုးသမီးများ၊ နို့စို့ ကလေးငယ်များ နှင့် ကလေးများအတွက် အထူးဖြည့်စွက်အာဟာရထောက်ပံ့မှု အစီအစဉ်) ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။

ကျွေးပြီးနောက်


ပြင်ဆင်ပြီးသော ကလေးဖြည့်စွက်စာ သိမ်းဆည်းခြင်း-

- ဤညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သင့်ကလေး တစ်ကြိမ်စားနိုင်သည့်ထက် ပိုများသော ဖြည့်စွက်စာကို ရလာနိုင်ပါသည်။ မကျွေးမီ ဖျော်စပ်ထားသော ဖြည့်စွက်စာကို 2 မှ 4 oz ပုလင်းများထဲသို့ ခွဲထည့်ပါ။
- ဖျော်စပ်ပြီးသော ဖြည့်စွက်စာနို့မှုန့်ကို ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းကာ 24 နာရီမကျော်မီ အသုံးပြုပါ။

ကလေးဖြည့်စွက်စာအပြောင်းအလဲအတွက် အဆင့်များ-



၁



8 OZ ခန့် ပုလင်း ပြုလုပ်ရန်-

ကလေးဖြည့်စွက်စာအသစ် ကျွေးကြည့်ပါ

သင့်နို့စို့ကလေးငယ် စားနိုင်သလား သိနိုင်ရန် ကလေးဖြည့်စွက်စာအသစ် ကျွေးကြည့်ပါ။ သင့်နို့စို့ကလေး အရင်က စားဖူးကြည့်ပြီး မကြိုက်ဘူးဆိုပါက ထပ်စမ်းကြည့်ပါ။ ကလေးများသည် ကြီးပြင်းလာသည်ဖြစ်၍ သူတို့၏ အရသာလည်း ပြောင်းလဲလာပါသည်။

ကလေးဖြည့်စွက်စာအသစ်တွင် ဖြည်းဖြည်းချင်း ရောမွှေပါ

လက်ရှိ ကလေးနို့မှုန့်တွင် ကလေးဖြည့်စွက်စာအသစ် ပမာဏအနည်းငယ်ကို စထည့်ကြည့်ပါ။ ကလေးဖြည့်စွက်စာအသစ်ကို နေ့စဉ်ပမာဏတိုး၍ ထည့်ကြည့်ပါ။ သို့မှသာ သင့်နို့စို့ ကလေးသည် မတူကွဲပြားသော အရသာကို အသားကျလာပါလိမ့်မည်။ တစ်ပတ်အတွင်း သင့်နို့စို့ ကလေးငယ်သည် ကလေးဖြည့်စွက်စာအသစ်ကို လက်ခံလာပါလိမ့်မည်။ ကလေးဖြည့်စွက်စာအသစ်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း စကျွေးရန် အောက်ပါ ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာပါ။

	နေ့ 1 နှင့် 2 တွင်	နေ့ 3 နှင့် 4 တွင်	နေ့ 5 နှင့် 6 တွင်	နေ့ 7 တွင်
ကလေးဖြည့်စွက်စာ နို့မှုန့် ဘူးအရွယ်အစားပေါ်မူတည်၍ ဤအဆင့်များကို လိုက်နာရန် ကလေးဖြည့်စွက်စာအသစ် 1-2 ဘူး လိုအပ်သည်။ ကလေးဖြည့်စွက်စာဘူးနှင့်အတူ ပါသည့် ဇွန်းကိုသာ အမြဲသုံးပါ။	ရောနှောပါ ၈ oz + 3 ဇွန်း ကလေးဖြည့်စွက်စာအဟောင်း + 1 ဇွန်း ကလေးနို့မှုန့်အသစ်	ရောနှောပါ ၈ oz + 2 ဇွန်း ကလေးနို့မှုန့်အဟောင်း + 2 ဇွန်း ကလေးနို့မှုန့်အသစ်	ရောနှောပါ ၈ oz + 1 ဇွန်း ကလေးနို့မှုန့်အဟောင်း + 3 ဇွန်း ကလေးနို့မှုန့်အသစ်	ပြင်ဆင်မှုအတွက် ကလေးနို့မှုန့်ဘူးအသစ်ပါ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
အရည်ပျစ် ကလေးဖြည့်စွက်စာ ဘူးအရွယ်အစားပေါ်မူတည်၍ ဤအဆင့်များကို လိုက်နာရန် ကလေးနို့မှုန့် အသစ် 6-10 ဘူး လိုအပ်သည်။	ရောနှောပါ ၄ oz + 3 oz ကလေးဖြည့်စွက်စာအဟောင်း + 1 oz ကလေးဖြည့်စွက်စာအသစ်	ရောနှောပါ ၄ oz + 2 oz ကလေးဖြည့်စွက်စာအဟောင်း + 2 oz ကလေးဖြည့်စွက်စာအသစ်	ရောနှောပါ ၄ oz + 1 oz ကလေးဖြည့်စွက်စာအဟောင်း + 3 oz ကလေးဖြည့်စွက်စာအသစ်	ပြင်ဆင်မှု အတွက် ကလေးဖြည့်စွက်စာဘူးအသစ်ပါ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။



DOH 961-149 June 2023 Burmese
 ဤရွက်စာတမ်းကို အခြားဖောက်တစ်ခု ဖြင့်ရယူလို ပါက 1-800-841-1410 ကို ဖုန်းခေါ်ပါ။ နားမကင်းသူများနှင့်အစာခြားအခွင့်ချို့ယွင်းနေသည့် ဖောက်သည်များအတွက် 711 (Washington Relay) သို့ ဖုန်းခေါ်ပေးပါ သို့မဟုတ် WIC@doh.wa.gov သို့ အီးမေးလ်ပို့ပေးပါ။