


# ការណែនាំរ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ថ្មីសម្រាប់កុមារអាយុ 6 ខែ - 4 ឆ្នាំ



រ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ថ្មីឆ្នាំ 2023-2024 អាចការពារកុមារតូចៗកុំឱ្យឈឺធ្ងន់ធ្ងរ ចូលសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ និងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19។ ការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា ទោះបីរ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 នៅតែមានប្រសិទ្ធភាព ក៏វាអាចនឹងថយប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការការពារបន្តិចម្តងៗដែរ។

**ការចាក់រ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ឱ្យទាន់សភាពការណ៍នៅតែជាវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុត ដើម្បីបន្ត ការការពារនេះ។**

សូមមើលតារាងខាងក្រោម ដើម្បីដឹងពីចំនួនដូសដែលកូនរបស់អ្នកត្រូវការដើម្បីចាក់រ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ទាន់សភាពការណ៍។

ឃីហោ រ៉ាក់សាំង	អាយុ	ដូសសម្រាប់កុមារមិនទាន់ចាក់រ៉ាក់សាំង	កុមារបានចាក់រ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ពីមុន
Pfizer	6 ខែ - 4 ឆ្នាំ	ដូសទី 1៖ រ៉ាក់សាំងថ្មីឆ្នាំ 2023-2024។	បានចាក់ 1 ដូសពីមុន៖ ដូសទី 2 នៃរ៉ាក់សាំងថ្មីឆ្នាំ 2023-2024 ក្រោយចាក់ដូសដំបូង 3-8 សប្តាហ៍។
		ដូសទី 2៖ រ៉ាក់សាំងថ្មីឆ្នាំ 2023-2024 ក្រោយចាក់ដូសទី 1 បាន 3-8 សប្តាហ៍។	ដូសទី 3 ក្រោយចាក់ដូសទី 2 បាន 8 សប្តាហ៍ រ៉ាក់សាំងថ្មីឆ្នាំ 2023-2024។
Moderna	6 ខែ - 4 ឆ្នាំ	ដូសទី 1៖ រ៉ាក់សាំងថ្មីឆ្នាំ 2023-2024។	បានចាក់ 2 ដូសឡើងទៅ៖ 1 ដូសនៃរ៉ាក់សាំងថ្មីឆ្នាំ 2023-2024 ក្រោយដូសចុងក្រោយយ៉ាងតិច 8 សប្តាហ៍។
		ដូសទី 2៖ រ៉ាក់សាំងថ្មីឆ្នាំ 2023-2024 ក្រោយចាក់ដូសទី 1 បាន 4-8 សប្តាហ៍។	បានចាក់ 1 ដូសពីមុន៖ 1 ដូសនៃរ៉ាក់សាំងថ្មីឆ្នាំ 2023-2024 ក្រោយចាក់ដូសចុងក្រោយបាន 4-8 សប្តាហ៍។
Novavax		Novavax មិនផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុក្រោម 12 ឆ្នាំទេ។	បានចាក់ 2 ដូសឡើងទៅ៖ 1 ដូសនៃរ៉ាក់សាំងថ្មីឆ្នាំ 2023-2024 ក្រោយចាក់ដូសចុងក្រោយបាន 4-8 សប្តាហ៍។

ប្រសិនបើអ្នក កមានប្រព័ន្ធ ភាពស៊ាំចុះខ្សោយកម្រិតមធ្យមឬធ្ងន់ រ ទោះគោលការណ៍ណែនាំនឹងមានភាពខុសគ្នា។



\*បុគ្គលដែលបានឆ្លងមេរោគ SARS-CoV-2 ថ្មីៗនេះអាចពិចារណាពន្យារពេលចាក់ដូសរ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ត្រឹម 3 ខែចាប់ពីពេលចេញរោគសញ្ញា ឬធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមាន (បើការឆ្លងគ្មានរោគសញ្ញាទេ)។ ការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា (ជាភាសាអង់គ្លេស) គម្លាតពេលវេលាកាន់តែយូររវាងការឆ្លងជំងឺ និងការចាក់រ៉ាក់សាំងអាចធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំឆ្លើយតបនឹងរ៉ាក់សាំងកាន់តែប្រសើរ។ មិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះ គេសង្កេតឃើញថាមានហានិភ័យទាបដែលអាចឆ្លងជំងឺឡើងវិញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទៅប៉ុន្មានខែ បន្ទាប់ពីឆ្លងជំងឺរួច។ គួរតែពិចារណាលើកត្តាបុគ្គលដូចជា ហានិភ័យដែលអាចនឹងឈឺធ្ងន់ដោយសារជំងឺ COVID-19, កម្រិតឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ ឬលក្ខណៈនៃប្រភេទវីរុស SARS-CoV-2 ដីកាចសាហាវ នៅពេលកំណត់ថាត្រូវពន្យារពេលចាក់ 1 ដូសឬអត់ បន្ទាប់ពីឆ្លងជំងឺ។

