

ការព្យាបាលជំងឺ COVID-19

ការណែនាំគ្រួសារ

ប្រភេទនៃការព្យាបាលជំងឺ COVID-19	ប្រព័ន្ធកាត់ស៊ីសបង្ការជាមុន	អង់ទីកម្មប្រឆាំងជំងឺ	ថ្នាំលេបប្រឆាំងជំងឺ	ថ្នាំចាក់ប្រឆាំងជំងឺ
អ្វីដែលមានផ្តល់ជូន	Evusheld	Bebtelovimab	Lagevrio (molnupiravir) Paxlovid	VEKLURY (remdesivir)
តើប្រើសម្រាប់អ្នកណា?	<p>អ្នកជំងឺជាកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យ (យ៉ាងតិច 12 ឆ្នាំឡើងទៅ) មានទម្ងន់យ៉ាងតិច 40 គីឡូក្រាម) ដែល៖</p> <ul style="list-style-type: none"> • បច្ចុប្បន្នមិនបានឆ្លងវីរុស SARS-CoV-2 (COVID-19)។ • ថ្មីៗនេះមិនបានប៉ះពាល់ជាមួយបុគ្គលមានផ្ទុកវីរុស SARS CoV-2 (COVID-19)។ • មានប្រព័ន្ធភាពសុំចុះខ្សោយពីកម្រិតមធ្យមទៅធ្ងន់ធ្ងរ។ • មិនត្រូវបានណែនាំឱ្យចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19។ 	<p>អ្នកជំងឺជាកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យ (យ៉ាងតិច 12 ឆ្នាំឡើងទៅ) និងមានទម្ងន់យ៉ាងតិច 40 គីឡូក្រាម) ដែល៖</p> <ul style="list-style-type: none"> • មានហានិភ័យខ្ពស់ដែលអាចវិវឌ្ឍទៅជាជំងឺ COVID-19 កម្រិតធ្ងន់ រួមទាំងការចូលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឬស្លាប់ផងដែរ។ 	<p>Paxlovid:</p> <ul style="list-style-type: none"> • អ្នកជំងឺជាកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យ (12 ឆ្នាំឡើងទៅ) មានទម្ងន់យ៉ាងតិច 40 គីឡូក្រាម)។ <p>Lagevrio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • មនុស្សពេញវ័យដែលមានហានិភ័យខ្ពស់អាចវិវឌ្ឍទៅជាជំងឺ COVID-19 កម្រិតធ្ងន់ រួមទាំងការចូលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឬស្លាប់ផងដែរ។ • មនុស្សពេញវ័យដែលមិនត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើជម្រើសផ្សេងក្នុងការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ឬមិនមានលទ្ធភាពទទួលបានការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ផ្សេងទៀត។ 	<p>អ្នកជំងឺជាកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យ (12 ឆ្នាំឡើងទៅ) មានទម្ងន់យ៉ាងតិច 40 គីឡូក្រាម) ដែល៖</p> <ul style="list-style-type: none"> • ចូលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ • មិនចូលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ និងមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលអាចវិវឌ្ឍទៅជាជំងឺ COVID-19 កម្រិតធ្ងន់ រួមទាំងការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឬស្លាប់ផងដែរ។ <p>អ្នកជំងឺជាកុមារដែលមានទម្ងន់ 3.5 គីឡូក្រាម ដល់ក្រោម 40 គីឡូក្រាម ឬអ្នកជំងឺជាកុមារអាយុក្រោម 12 ឆ្នាំ មានទម្ងន់យ៉ាងតិច 3.5 គីឡូក្រាមដែល៖</p> <ul style="list-style-type: none"> • ចូលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ • មិនចូលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ និងមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលអាចវិវឌ្ឍទៅជាជំងឺ COVID-19 កម្រិតធ្ងន់ រួមទាំងការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឬស្លាប់ផងដែរ។
តើទទួលបាននៅពេលណា?	2 សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងរួច	ក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃចុះក្រោមបន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19	ក្នុងរយៈពេល 5 ថ្ងៃចុះក្រោមបន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19	ក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃចុះក្រោមបន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19
តើទទួលបានតាមរបៀបណា?	អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព	អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព	អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពឱសថស្ថានក្នុងមូលដ្ឋាន	ទីតាំងថែទាំសុខភាពអ្នកជំងឺក្នុងមន្ទីរពេទ្យ

ព័ត៌មានបន្ថែមមាននៅគេហទំព័រ [hhs.gov](https://www.hhs.gov)

