

Protejarea sănătății dvs. și a bebelușului dacă aveți hepatită B și sunteți însărcinată

Hepatita B este o boală gravă, de care bebelușul poate suferi ulterior toată viața. Dacă sunteți însărcinată și aveți hepatită B, virusul poate infecta nou-născutul la naștere, în urma contactului cu sângele dvs. Pentru a preveni infectarea bebelușului și pentru propria dvs. sănătate, consultați furnizorul de servicii medicale încă de la începutul sarcinii și discutați despre hepatita B.



Utilizați această diagramă pentru a ține evidența serviciilor medicale de care dvs. și bebelușul ați beneficiat în timpul sarcinii și ulterior!

Pentru mamă

În timpul sarcinii

- ✓ Consultați furnizorul de servicii medicale referitor la hepatita B încă de la începutul sarcinii pentru a verifica nivelul virusului hepatitei B și funcția hepatică.
 - Dacă este necesar, furnizorul de servicii medicale vă poate prescrie medicamente pentru hepatita B.

La naștere

- ✓ Informați personalul spitalului cu privire la faptul că aveți hepatită B.
- ✓ Informați furnizorul de servicii medicale care va îngriji bebelușul cu privire la faptul că aveți hepatită B.

După naștere și mai târziu

- ✓ La vârsta de 1-2 luni, consultați furnizorul de servicii medicale referitor la îngrijirile asociate cu hepatita B.
 - Acest lucru este important mai ales dacă ați început tratamentul în timpul sarcinii.
- ✓ Consultați furnizorul de servicii medicale pentru monitorizarea hepatitei B cel puțin o dată la 6 luni.

Partenerul și persoanele cu care locuiți trebuie să se testeze și să se vaccineze împotriva hepatitei B pe durata cât sunteți însărcinată.



Pentru bebeluș

La naștere

Pentru a fi protejat împotriva infecției, bebelușul va primi 2 injecții în decurs de 12 ore de la naștere:

- ✓ O doză de imunoglobulină împotriva hepatitei B (HBIG)
- ✓ Doza 1 de vaccin împotriva hepatitei B

La vârsta de 1-2 luni

- ✓ Bebelușul va primi a 2-a doză de vaccin împotriva hepatitei B.

La vârsta de 6 luni

- ✓ Bebelușul va primi a 3-a doză de vaccin împotriva hepatitei B.

La vârsta de 9-12 luni

- ✓ Bebelușului i se vor efectua analize de sânge pentru verificarea stării hepatitei B și pentru evaluarea gradului de protecție.

Alăptarea

- ✓ Solicitați furnizorului de servicii medicale recomandări privind alăptarea și prevenirea sau gestionarea fisurilor sau sângerării sfârcurilor pentru a reduce contactul bebelușului cu sângele dvs.
- ✓ Dacă nou-născutul a primit la naștere doza de vaccin împotriva hepatitei B și imunoglobulină împotriva hepatitei B, riscul de transmitere a hepatitei B de la mamă la copil prin alăptare este foarte mic. După ce bebelușul primește aceste doze, poate fi alăptat în siguranță.