

# Захистіть свою дитину від вірусів, які можуть спричинити рак.

Вакцину проти ВПЛ (вірусу папіломи людини) можна вводити людям віком від 9 років. Вона захищає дітей від видів раку, спричинених ВПЛ.

## Дві причини для введення двох доз у віці 9 років

Вакцина проти ВПЛ є безпечною та формує кращий імунітет, якщо її вводити в ранньому віці. У дітей віком 9–12 років вакцина утворює найбільшу кількість антитіл – клітин, які борються з інфекцією. Вакцина вкрай ефективно запобігає зараженню деякими типами ВПЛ, якщо її ввести особі до моменту зараження.

Коли вашій дитині виповниться 9 років, проконсультуйтеся з лікарем щодо того, як захистити її від раку за допомогою вакцини проти ВПЛ. Додаткову інформацію можна отримати на сайті <https://www.doh.wa.gov/hpv> (тільки англійською мовою).



Щонайменше 35 900 осіб у США щороку захворюють на рак, спричинений ВПЛ.

Два види раку, які найчастіше спричиняє ВПЛ, – рак шийки матки в жінок і орофарингеальний рак у чоловіків.

Більшість дітей, які починають курс вакцинації у віці від 9 до 14 років, потребують лише ДВОХ доз вакцини проти ВПЛ. Особам, які починають курс вакцинації у віці від 15 до 26 років, потрібно ТРИ дози.



Щоб отримати цей документ в іншому форматі, зателефонуйте за номером 1-800-525-0127. Клієнтів із глухотою або з ослабленим слухом просимо телефонувати за номером 711 (Washington Relay) або писати на адресу електронної пошти [civil.rights@doh.wa.gov](mailto:civil.rights@doh.wa.gov).  
Feb. 2023 DOH #348-612 Ukrainian